



Obstsortenliste

zur Anlage von Streuobstwiesen

im



Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim

Nach den Landschaftspflegerichtlinien sind für unser Klima und Bodenverhältnisse geeignete Obstbäume, als Hochstamm angepflanzt, förderfähig. Hierzu zählen folgende Obstsorten:

Apfelsorten:

<i>Name</i>	<i>Genussreife</i>	<i>Verwendung</i>	<i>Farbe</i>
Adersleber Kalvill	Nov-März	T	mattgelb
Berner Rosen	Nov-Dez	T/M	dunkelviolett
Börtlinger Weinapfel	Okt-Nov	M	gelblich-hellrot
Rheinischer Bohnapfel	Feb-Mai	M	grünlichrot
Brauner Matapfel	Dez-Mai	T/M	gelbrot
Brettacher	Feb-Mai	T	weißlich-grün
Danziger Kantapfel	Okt-Jan	T	kräftig rot
Dülmener Rosenapfel	Sep-Dez	T	rötlich gelb
Erbachhofer Mostapfel	Sep-Nov	M	kräftig gerötet
Geflammtter Kardinal	Okt-Feb	T	strohgelb
Goldparmäne	Sept.-Okt	T	gelbgrün-gerötet
Gewürzluikenapfel	Dez-März	T/M	lebhaft rot
Goldrenette v. Blenheim	Nov-März	T/M	gelb-gerötet
Grahams Jubiläumsapfel	Okt-Dez	T/M	gelb, rot gepunktet
Gravensteiner	Sep-Okt	T/M	gelb-gerötet
Harberts Renette	Dez-Feb	T/M	lebhaft gelb
Hauxapfel	Nov-März	T/M	gelblichgrün
Jakob Fischer	Sep-Nov	T/M	gelb-gerötet
Kaiser Alexander	Sep-Dez	T	punktiert gerötet
Kaiser Wilhelm	Nov-März	T	kräftig gerötet
Kardinal Bea	Okt-Nov	T/M	gelb-gestreift

Name	Genussreife	Verwendung	Farbe
Schöner aus Schönwind	Nov-Jan	T	gelb, rot gestreift
Lohrer Rambur	Jan-Mai	T/M	gelb-gerötet
Öhringer Blutstreifling	Jan-Apr	T/M	gelb, rot gestreift
Purpurroter Cousinot	Dez-Juni	M	rot gestreift
Roter Eiserapfel	Dez-Juni	T	grün-rot
Rote Sternrenette	Nov-Feb	T	purpurrot
Roter Trierer Weinapfel	Nov-Apr	M	intensiv rot
Riesenboiken	Nov-Apr	T/M	gelbgrün
Schafsnase	Sep-Dez	M	punktiert gerötet
Schöner aus Herrenhut	Okt-Feb	T/M	gelb, rote Deckfarbe
Schöner v. Boskoop	Dez- Apr	T/M	grüngelb, berostet
Welschisner	Okt-Jan	M	zitronengelb
Wettringer Taubenapfel	Okt-Dez	T/M	intensiv gerötet
Zabergäu Renette	Nov- März	T/M	zimtfarbig
Zenngründer	Sep-Dez	T/M	gelb, rote Deckfarbe
Zuccalmaglios Renette	Nov-März	T/M	grüngelb, berostet

Birnensorten

Alexander Lucas	Okt-Dez	T	gelb
Blutbirn	Sep-Okt	T	dunkelgrün
Conference Birne	Sept	T/M	grünlichgelb
Doppelte Philippsbirne,	Sep-Okt	T/M	gerötet, hellgelb
Gräfin von Paris	Nov-Jan	T	grün
Gute Graue	Sept	T	zimtbraun
Köstliche von Charneu	Okt-Nov	T/M	gelbgrün
Madame Verte	Dez-Feb	T	bräunlich
Mollebusch	Sep-Nov	T/M	braun berostet

Name	Genussreife	Verwendung	Farbe
Muskatellerbirn	Aug	T	gelbgrün
Nordhäuser Winterforelle	Jan-März	T	verwaschen rot
Palmischbirne	Sep	M	hellgelb, berostet
Petersbime	Juli-Aug	T/M	rötlichgelb
Pfalzgrafenbirn	Sep-Okt	T/M	dunkelrot
Schweizer Wasserbirne	Sep	M	grün-gelb
Stuttgarter Geißhirtle	Aug-Sep	T	grün-gelb
Zuckerbirne	Okt-Dez	T	grün-gelb

Zwetschgen- und Pflaumensorten

Bühler Frühzwetschge	VIII	widerstandsfähig, feuchte Böden
Hauszwetschge	IX-X	sehr robust, anspruchslos
Ortenauer	VIII-IX	anspruchslos
Wangenheims Frühzwetschge	VIII-IX	für rauhe Lagen, starkwüchsig
Lützelsachser Frühzwetschge	VII	anspruchslos
Zibarten	IX-X	Brennfrucht
Nancy-Mirabelle	IX	Brennfrucht

Süßkirschen

Burlat (keine Kirschfruchtfliege)	1.-2. KW	dunkelrot
Kassins Frühe “ “	1.-2. KW	platzfest
Haumüllers Mitteldicke	5.-6.KW	braunrot
Dönissens Gelbe Knorpelkirsche	5.-7. KW	kaum Vogelfraß
Hedelfinger Riesenkirsche	4.-5. KW	dunkelrot
Große Schwarze Knorpel	5.-6. KW	schwarz

Sonstige:

Speierling	(Sorbus domestica)
Elsbeere	(Sorbus torminalis)
Walnussbaum	(Juglans regia)